

# CHIRURGIE IMPLAN- TAIRE



## A retenir

- **La mise en place d'implant dentaire est une intervention réalisée sous anesthésie locale**
- **Elle consiste à décoller la gencive, puis réaliser un puit implantaire dans l'os. L'implant est ensuite vissé dans l'os de la mâchoire. La gencive est ensuite remplacée et suturée**
- **Une période de cicatrisation allant de 2 à 4 mois permet d'obtenir l'ostéointégration de l'implant sur l'os**
- **Deux grands types d'implants sont utilisés : les implants enfouis et non enfouis**

## PRINCIPE

La **mise en place d'implant dentaire** est une intervention réalisée sous anesthésie locale.

Elle consiste à décoller la gencive, puis réaliser un **puits implantaire** dans l'os à l'aide d'instruments spécifiques et calibrés. L'implant est ensuite vissé afin de le stabiliser dans l'os de la mâchoire. La gencive est ensuite remplacée et suturée.

Après sa mise en place, l'os va cicatriser sur l'implant dentaire et se souder à la surface de celui-ci. C'est ce que l'on appelle l'**ostéointégration**. Une période de cicatrisation allant de 2 à 4 mois permet d'obtenir cette ostéointégration. Dans les cas d'une reconstruction osseuse, la durée de cicatrisation des implants dentaires est plus longue et peut aller de 4 à 8 mois.


Deux grands types d'implants sont utilisés selon les indications :

- **Les implants enfouis** : ils sont placés dans l'os et recouverts par la gencive dans un premier temps. Une seconde intervention de découverte est réalisée, après leur ostéointégration, pour la mise en place d'une vis de cicatrisation qui traverse la gencive.

Ces implants sont indiqués dans les zones antérieures de la mâchoire supérieure pour des raisons esthétiques



- **Les implants non enfouis** : ils sont placés dans l'os et comportent un col lisse qui traverse la gencive. Ils reçoivent leur vis de cicatrisation au moment de leur pose. La gencive est alors suturée autour de l'implant et de sa vis de cicatrisation. La cicatrisation gingivale se fait dans le même temps que l'ostéointégration de l'implant. Ces implants sont indiqués dans les zones postérieures de la mâchoire et permettent un meilleur accès aux techniques d'hygiène buccodentaire.



Les implants dentaires ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques validant leur innocuité et leurs propriétés biologiques.

Leur traçabilité est assurée par le cabinet et un double vous est remis à l'issue de votre intervention.

Pour plus d'information vous pouvez consulter notre fiche sur le principe des implants dentaires.

Cabinet dentaire CPIA

38, Bd Jean Monnet - 44400 Rezé - Tél : 02 28 200 110

*Les informations accessibles sur la présente fiche sont mises à la disposition des utilisateurs à titre purement indicatif. Les utilisateurs reconnaissent qu'ils en font usage sous leur seule responsabilité. En conséquence, le cabinet CPIA ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant pour tout ou partie de l'utilisation des informations et des réponses proposées via cette fiche-intervention.*