

EXTRACTION DENTAIRE



A retenir

- **Toute extraction dentaire doit donner lieu à une consultation pré-opératoire**
- **Après l'intervention, il convient d'éviter de manger ou boire avant la disparition complète de l'anesthésie**
- **Il est important de bien respecter les traitements notamment les antalgiques prescrits lors de la consultation pré-opératoire**

PRINCIPE

Les dents nécessitent dans certaines circonstances d'être extraites. Il existe de nombreuses indications d'extractions :

- **carie volumineuse** entraînant un délabrement important ne permettant pas la restauration de la dent
- **infection importante de la dent**
- **atteinte parodontale terminale** (tissus de soutien de la dent)
- **traumatismes**
- **raisons orthodontiques** (manque de place)
- **dents inutilisables au niveau prothétique**

Toute extraction dentaire doit donner lieu à une consultation pré-opératoire permettant d'évaluer d'éventuels contre-indications, risques, difficultés opératoires, le temps d'intervention et de réaliser les prescriptions pré-opératoires. Cet acte se réalise sous anesthésie locale et est indolore. Seules des sensations de tractions et de pressions existent pendant l'extraction. Cette intervention peut donner lieu à la réalisation de points de sutures avec du fil résorbable.

Après l'intervention, il convient d'éviter de manger ou boire avant la disparition complète de l'anesthésie (risque de morsure). En cas d'œdème, l'application d'une poche de glace peut limiter son importance. Il est important de bien respecter les traitements notamment les antalgiques prescrits lors de la consultation pré-opératoire. Pour éviter les saignements, il est recommandé de ne pas cracher après les interventions de chirurgie buccale.

Pour plus d'information vous pouvez consulter notre fiche « Que faire en cas d'urgence ? »